

## نایقینی در سنجش عملی ی احتمال

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

یک راه سنجش احتمال یک پدیده این است که آن پدیده را بارها را می‌تازم‌اند و تعداد رخ-دادها ی پدیده تقسیم بر تعداد آزمایشها را برابر با احتمال آن پدیده می‌گیرند. مقداری که به این طریق به دست می‌تاید نایقینی دارد. رابطه ی این نایقینی با تعداد بارها ی آزمایش بررسی می‌شود.

### 0 درآمد

یک پدیده با احتمال  $p$  رخ می‌دهد. اگر این پدیده  $N$  بار آزموده شود، احتمال این که  $n$  (تعداد بارها بی که این پدیده رخ می‌دهد)  $n$  باشد از تزیع د-جملتی به دست می‌تاید:

$$\text{Pro}(n = n) = \binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N-n}, \quad (1)$$

که Pro احتمال است. مقدار چشمداشتی و وردایی را با، به ترتیب،  $E$  و  $Var$  نشان میدهم.

$$E(n) = N p. \quad (2)$$

$$Var(n) = N p (1 - p). \quad (3)$$

پس با  $N$  بار آزمایش و  $n$  بار رخ-دادن،  $es(p)$  با

$$es(p) = \frac{n}{N} \quad (4)$$

یک تخمین برای  $p$  است. و هر چه  $N$  بزرگتر شود این تخمین دقیقتر میشود. سؤال این است که این تخمین چه قدر به واقعیت ( $p$ ) نزدیک است. کمی-تر، با  $p$  که چنین تعریف میشود

$$p = \frac{n}{N}, \quad (5)$$

حد پایین برای  $N$  چنان که

$$Pro(|p - p| > \alpha) < \beta \quad (6)$$

چيست؟

## 1 چگالی احتمال برای تعداد زیاد آزمایش

بر اساس قضیه حد مرکزی، در حد  $N$  ها بزرگ، توزیع احتمال برای  $p$  گاوسی میشود، مثلن [1]. چگالی-ی-احتمال متناظر با یک توزیع گاوسی با میانگین و انحراف-معیار توزیع مشخص میشود. چگالی احتمال را با  $pro$ ، میانگین  $p$  را با  $\mu$ ، و انحراف-معیار  $p$  را با  $\sigma$  نشان میدهم:

$$\mu = E(p). \quad (7)$$

$$\sigma = \sqrt{Var(p)}. \quad (8)$$

$$pro(p = x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]. \quad (9)$$

از (2) و (3) و (5) دیده میشود

$$\mu = p. \quad (10)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}. \quad (11)$$

## 2 دقت تخمین احتمال

از (9) و (10) دیده میشود برای  $N$  ها بزرگ،

$$\begin{aligned} \text{Pro}(|\mathbf{p} - p| > \alpha) &= 1 - \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{dy}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right), \\ &= 1 - \text{erf}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}\sigma^2}\right), \end{aligned} \quad (12)$$

که erf تابع خطا است. با استفاده از (11)،

$$\text{Pro}(|\mathbf{p} - p| > \alpha) = 1 - \text{erf}\left(\frac{\alpha\sqrt{N}}{\sqrt{2p(1-p)}}\right). \quad (13)$$

به این ترتیب شرط (6) میشود

$$N > M, \quad (14)$$

که

$$M = \frac{2p(1-p)}{\alpha^2} \text{erf}^{-1}(1-\beta). \quad (15)$$

$M$  کمینه ی تعداد آزمایشها ی لازم برای این است که شرط (6) برآورده شود.

نایقینی با یک احتمال کمتر از  $\alpha$  است. شرط (6)، یا هم-ارز با آن (14) و (15)، این است که این احتمال از  $(1-\beta)$  بیشتر باشد. دیده میشود  $M$  با  $\alpha^{-2}$  متناسب است. بستگی ی  $M$  به  $\beta$  ملایمتر است:

$$\text{erf}^{-1}(1-\beta) = \begin{cases} 3.46, & \beta = 10^{-6} \\ 1.16, & \beta = 10^{-1} \end{cases}. \quad (16)$$

برای  $\beta$  های کوچک،

$$\operatorname{erf}^{-1}(1 - \beta) = \sqrt{-\ln(\sqrt{\pi}\beta) - \ln\sqrt{-\ln(\sqrt{\pi}\beta)} + \dots}, \quad \beta \ll 1. \quad (17)$$

نتیجه این که برای یک احتمال معقول (نزدیک به یک، ولی ن بسیار نزدیک به یک)،

$$M = \frac{\gamma}{\alpha^2}, \quad (18)$$

که  $\gamma$  از مرتبه  $\gamma$  یک است.

### 3 پانوشتها

- [1] William Feller; "an introduction to probability theory and its applications, volume I" 3rd edition (John Wiley & Sons, 1968) chapter X